

Lääke	Raskauden aikana	Imetyksen aikana
ASA	voi käyttää <sup>1</sup>	voi käyttää
Indometasiini	ei suositella	ei suositella
Muut NSAIDt	voi käyttää <sup>1,2</sup>	voi käyttää <sup>1,2</sup>
Klorokiinivalmisteet	voi käyttää äidin indikaatiolla <sup>3</sup>	voi käyttää
Aurotiomalaatti	lopetetaan, kun raskaus todetaan	voi käyttää
Auranofiini	ei suositella	ei suositella
Atsatiopriini	voi käyttää äidin indikaatiolla	ei suositella
Metotreksaatti	lopetettava 3 kk ennen raskautta (naiset)	kielletty
Syklofosfamidi	lopetettava 3 kk ennen raskautta	kielletty
Sulfasalatsiini	voi käyttää	voi käyttää
Siklosporiini	voi käyttää äidin indikaatiolla	kielletty
Podofyllotoksiini	lopetettava 3 kk ennen raskautta	kielletty
Leflunomidi	lopetettava 2 v ennen raskautta (naiset) <sup>4</sup>	kielletty
Mykofenolaatti	lopetettava 6 vi ennen raskautta	kielletty
Klorambusiili	kielletty	kielletty
Kortikosteroidit	voi käyttää	voi käyttää
Abatacepti	lopetettava 3 kk ennen raskautta <sup>5</sup>	ei suositella <sup>5</sup>
Adalimumabi	lopetettava 5 kk ennen raskautta <sup>5</sup>	ei suositella <sup>5</sup>
Anakinra	lopetettava 1 vi ennen raskautta <sup>5</sup>	ei suositella <sup>5</sup>
Etanersepti	lopetettava 2 vi ennen raskautta <sup>5</sup>	ei suositella <sup>5</sup>
Infliximabi	lopetettava 6 kk ennen raskautta <sup>5</sup>	ei suositella <sup>5</sup>
Rituximabi	lopetettava 12 kk ennen raskautta <sup>5</sup>	ei suositella <sup>5</sup>
Tosilitsumabi	lopetettava 6 kk ennen raskautta <sup>5</sup>	ei suositella <sup>5</sup>

<sup>1</sup>Äidin ja lapsen verenvuotoriskin ja lapsen pulmonaalihypertensioriskin takia suositellaan lopetettavaksi viimeistään 2 vi ennen synnytystä

<sup>2</sup>Suosittellaan käytettäväksi lyhytvaikutteisia

<sup>3</sup>SLE-potilailla lääkkeen tauotus voi aiheuttaa taudin aktivoitumisen, joten heillä ei suositella taukoa

<sup>4</sup>Lääkkeen vaikutusta voi vähentää 11 vrk kolestyramiinihoidolla (8gx3). Lääkeaine pitoisuus kontrolloitava 2 kertaa poiston jälkeen (2 vi välein). Raskaus mahdollinen 2 kk poistolääkityksen jälkeen

<sup>5</sup> HUOM. Biologisten lääkkeiden osalta ohjeet voivat muuttua varsin usein, päivitettyt ohjeet Suomen teratologisesta tietopalvelusta (09-4711). Miesten ei tämän hetkisten ohjeiden mukaan tarvitse tauottaa biologisia lääkkeitä suunniteltaessa perheenisäystä