

Rokotus tulehduksellisissa reumasairauksissa

- Ilman immunosuppressiivista hoitoa olevat potilaat rokotetaan normaalin käytännön mukaan
- sulfasalasiini, kultavalmisteen, hydroksiklorokiini
- Lääkkeet, jotka heikentävät immuunipuolustusta
 - o Biologiset lääkkeet
 - o Solunsalpaajat (metotreksaatti, atsatiopriini, syklosporiini, leflunomidi, Reumacon®, syklofosfamidi, klorambusiili)
 - o Pysyvä systeeminen glukokortikoidihoito (prednison 10 mg/vrk tai vastaava)
- Inaktivoituja eli tapettuja mikrobeja tai mikrobin puhdistettuja antigeneja sisältäviä rokotteita voi antaa immunosuppressiivisen hoidon aikana
 - o Lääkehoitoja ei tauoteta ennen tai jälkeen rokotamisen
 - o Rokotusvaste on huonompi kuin terveillä aikuisilla
- Rokotukset, jotka pidetään voimassa kaikilla
 - o Kurkkumätä ja jäykkäkouristus (dT)
 - tehostusväli 10 v
 - eivät sisällä eläviä mikrobeja
- Rokotukset, joita saa antaa, koska rokotteet eivät sisällä eläviä mikrobeja
 - o Influenssa
 - annetaan kaikille > 65-vuotiaille
 - annetaan immunosuppressiivista hoitoa saaville tai muihin riskiryhmiin kuuluville
 - o Pneumokokki
 - kaikille rituksimabi-hoitoa saaville (2)-4 vi ennen hoidon aloitusta
 - suositellaan >65-vuotiaille sekä kaikille, joiden kuuluu saada influenssa-rokotus
 - Huom. tehostusrokotus kertaalleen 5 v kuluttua
 - o Meningokokki
 - tehostusväli 3-5 v
 - o Hib
 - asplenia, invasiivisen Hib-infektion esto
 - Ei tehostustarvetta
 - o A- ja B-hepatiittirokotteet
 - o Kolerarokote
 - o Inaktivoitu (pistettävä) poliorokote
 - o Vesikauhurokote
 - o Inaktivoitu (pistettävä) lavantautirokote
 - o Puutiaisaivotulehdus (Kumlingen tauti) rokote
 - o Japaninaiivotulehdusrokote
- Elävät rokotteet – näitä ei saa antaa immunosuppressiivisen hoidon aikana
 - o Vesirokko- ja vyöruusurokote
 - o Keltakuumerokote
 - Keltakuumeriskistä yksittäisissä matkakohteissa kannattaa konsultoida HYKS:n trooppisten tautien poliklinikkaa puh. 09-471 75930
 - o MPR
 - o Oraalinen poliorokote
 - o Oraalinen lavantautirokote
 - o BCG (vain TB-riskiryhmiin kuuluvat rokotetaan 1.9.2006 lähtien)
 - o Isorokkorokote (ei käytössä)
- Eläviä, heikennettyjä mikrobeja sisältäviä rokotteita saa antaa glukokortikoideja saaville, joilla ei ole muita immuunipuolustusta heikentäviä lääkityksiä
 - jos annos vastaa ≤ 10 mg/vrk prednisonia
 - jos annos vastaa > 10 mg/vrk prednisonia mutta hoitoaika on alle 2 vk
 - jos yli 2 vk kestäneen glukokortikoidihoidon, joka vastaa > 10 mg/vrk prednisonia, lopettamisesta on kulunut vähintään 3 kk